

## MYC 800®

### Mode d'emploi

#### Champignons symbiotiques endomycorhizes

##### ■ Composition

800 spores/g *Glomus intraradices*, WP

Support: 80% kaolin, 20% diatomite

Matière sèche > 91%

Masse volumique : 0.37 g/l

##### ■ Généralités

MYC 800 contient des spores de *Glomus intraradices*. Ces champignons microscopiques (endomycorhize) vivent en symbiose avec les racines des plantes (à l'image de nodosités chez les légumineuses) et forment un réseau de filaments mycéliens très fins dans le sol. Ces filaments prolongent les racines, augmentent le volume de sol exploré, sécrètent des enzymes et permettent ainsi améliorer la disponibilité des éléments nutritifs et de l'eau pour les plantes.

##### ■ Emploi

Pour agir, MYC 800 doit d'abord pénétrer dans les racines et par conséquent entrer en contact direct avec elles.

MYC 800 peut être appliqué de manière suivante :

- Mélanger aux semences : Saupoudrer MYC 800 sur les semences en brassant pour homogénéiser le tout. Suivant le type de semences (p. ex. maïs), ajouter 0,7 l d'huile de colza pour 100 kg de semences afin d'assurer une bonne adhérence.
- Mélanger au terreau.
- Epandre directement sur les racines ou dans le trou de plantation.
- Arroser : Incorporer dans le sol avec suffisamment d'eau afin que les spores descendent au niveau des racines. Equipement : Aquanemix-2%, lance, arrosoir, système d'irrigation, etc.

Pour une meilleure efficacité et une application aisée, appliquer MYC 800 de préférence au moment de la mise en place de la culture (semis, plantation).

Ne pas appliquer de fongicides au sol ou de phosphates solubles pendant la phase de mise en place de la symbiose (4 semaines). Ne pas utiliser sur crucifères ou chénopodiacées.

##### Semis gazon

600 g pour 100 kg de semences ou 2500 m<sup>2</sup>.

Mélanger aux semences ou arroser dans le sol.

##### Bouture, planton, plante en pot

0,05-0,1 g/alvéoles.

0,2-0,5 g/pot.

Mélanger au terreau ou arroser.

##### Plantation

Le dosage se fait en fonction du volume des racines ou du trou de plantation : 1 g pour 1 l (voir exemple ci-dessous).

Epandre directement sur les racines ou dans le trou de plantation ou arroser après la plantation.

##### Exemple :

| Volume des racines ou du trou | Dosage Myc 800 |
|-------------------------------|----------------|
| 0,5 l                         | 0,5 g          |
| 1 l                           | 1 g            |
| 5 l                           | 5 g            |
| 20 l                          | 20 g           |

##### ■ Mélange

Ne pas mélanger avec des fongicides ou des engrais phosphatés

##### ■ Conservation et stockage

20 mois. Conserver à température ambiante à l'abri du gel et à des températures < 25 °C.

##### ■ Premiers secours

Après un contact avec la peau : rincer avec beaucoup d'eau, enlever les vêtements contaminés et bien les laver avant leur réemploi

Après un contact avec les yeux : rincer les yeux à l'eau courante pendant 15 min au minimum (bien écarter les paupières).

Après ingestion : rincer tout de suite la bouche, ne pas faire vomir.

Après inhalation: donner de l'air frais.

##### ■ Emballage

600 g

200 g

*S'il n'est pas utilisé de manière appropriée, ce produit risque de porter atteinte à la fertilité du sol, à l'état des eaux et de l'air et de nuire à la qualité des plantes.*

*Ne doit pas être appliqué ni dans les réserves naturelles ni dans les roselières et les marais; ni dans les haies, les bosquets et la forêt (y inclus une bande de 3 m de large le long de ces éléments); ni dans les eaux superficielles (y inclus une bande de 3 m de large le long de ces eaux), ainsi que dans la zone S1 (zone de captage) des zones de protection des eaux souterraines.*

® = marque enregistrée de Lallemand